

Glyxambi®
(Empagliflozin/
Linagliptin)



EIN STARKES DUO FÜR TYP-2-DIABETES



Jardiance®
(Empagliflozin)

Glyxambi® 10 mg/5 mg Filmtabletten, Glyxambi® 25 mg/5 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Empagliflozin und Linagliptin. **Zusammensetzung:** Eine Tablette Glyxambi® enthält 10 mg bzw. 25 mg Empagliflozin und 5 mg Linagliptin. **Sonstige Bestandteile:** Mannitol, Vorverkleisterte Stärke (Mais), Maisstärke, Copovidon, Crospovidon (Typ B), Talkum, Magnesiumstearat (pflanzlich), Hypromellose, Titandioxid (E171), Macrogol 6000, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172) (Glyxambi® 10 mg/5 mg) bzw. Eisen(III)-oxid (E172) (Glyxambi® 25 mg/5 mg). **Anwendungsgebiete:** Glyxambi wird angewendet bei Erwachsenen ab 18 Jahren mit Typ-2-Diabetes mellitus zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle, wenn Metformin und/oder Sulfonylharnstoff (SH) und eine der Monosubstanzen von Glyxambi zur Blutzuckerkontrolle nicht ausreichen oder wenn der Patient bereits mit der freien Kombination von Empagliflozin und Linagliptin behandelt wird. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, einen anderen SGLT-2-Inhibitor, einen anderen DPP-4-Inhibitor oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** *Häufig:* Hypoglykämie (bei Kombination mit SH oder Insulin), vaginale Candidiasis, Vulvovaginitis, Balanitis, andere genitale Infektionen, Harnwegsinfektionen (einschließlich Pyelonephritis und Urosepsis), Nasopharyngitis, Husten, Durst, Pruritus (generalisiert), Ausschlag, verstärkte Harnausscheidung, Amylase erhöht, Lipase erhöht. *Gelegentlich:* Überempfindlichkeit, Angioödem, Urtikaria, Pankreatitis, Volumenmangel, Dysurie, Hämatokrit erhöht, Serumlipide erhöht, Kreatinin im Blut erhöht/glomeruläre Filtrationsrate vermindert. *Selten:* diabetische Ketoazidose, Mundulzeration, *Häufigkeit nicht bekannt:* Bullöses Pemphigoid, nekrotisierende Fasiitis des Perineums (Fournier-Gangrän). **Warnhinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Weitere Hinweise:** Siehe Fachinformation. Verschreibungspflichtig. **Stand:** Oktober 2019

Jardiance® 10 mg/25 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Empagliflozin. **Zusammensetzung:** Eine Tablette Jardiance® enthält 10 mg bzw. 25 mg Empagliflozin. **Sonstige Bestandteile:** Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, Croscarmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Hypromellose, Titandioxid (E171), Talkum, Macrogol (400), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172). Jede Tablette enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg). **Anwendungsgebiete:** Jardiance wird zur Behandlung von Erwachsenen mit nicht ausreichend behandeltem Typ-2-Diabetes mellitus als Ergänzung zu Diät und Bewegung angewendet: als Monotherapie bei Metforminunverträglichkeit u. zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung von Diabetes. Zu Studienergebnissen im Hinblick auf Kombinationen, die Wirkung auf Blutzuckerkontrolle und kardiovaskuläre Ereignisse sowie die untersuchten Populationen siehe Fachinformation, Abschnitte 4.4, 4.5 und 5.1. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** *Sehr häufig:* Hypoglykämie (bei Kombination mit Sulfonylharnstoff oder Insulin). *Häufig:* vaginale Moniliasis, Vulvovaginitis, Balanitis, andere genitale Infektion, Harnwegsinfektion (einschließlich Pyelonephritis und Urosepsis), Pruritus (generalisiert), Hautausschlag, verstärkte Harnausscheidung, Durst, Serumlipide erhöht. *Gelegentlich:* Urtikaria, Volumenmangel, Dysurie, Kreatinin im Blut erhöht/glomeruläre Filtrationsrate vermindert, Hämatokrit erhöht. *Selten:* diabetische Ketoazidose. *Häufigkeit nicht bekannt:* Angioödem, nekrotisierende Fasiitis des Perineums (Fournier's Gangrän). **Warnhinweise:** Enthält Lactose. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Weitere Hinweise:** Siehe Fachinformation. Verschreibungspflichtig. **Stand:** Sep. 2020

Pharmazeutischer Unternehmer: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Tel.: 08 00 / 77 90 90 0, Fax: 061 32 / 72 99 99,
E-Mail: info@boehringer-ingelheim.com

